

Topiramato

Tratamiento Enfocado en Recuperación para el Trastorno por Uso de Alcohol

¿Cómo puede topiramato ayudarme a reducir o dejar de beber?

El topiramato puede reducir su impulso o deseo de beber y puede ayudarlo a reducir o dejar de beber. Este medicamento también puede disminuir su deseo de continuar bebiendo si comienza a beber nuevamente.

¿Cómo funciona Topiramato?

- El topiramato actúa en su cerebro para reducir su deseo de beber alcohol.
- Puede ayudarlo a beber menos y ayudarlo a elegir no beber.

¿Necesitaré otras formas de tratamiento?

Un programa exitoso de tratamiento de alcohol incluirá una combinación de medicina y apoyo social, como reuniones de Alcohólicos Anónimos (AA), asesoramiento, terapia individual o grupal, y en ocasiones tratamiento hospitalario.

¿Qué debo saber antes de comenzar topiramato?

- El topiramato se usa para las convulsiones y las migrañas y también se ha demostrado que ayuda a tratar el trastorno por consumo de alcohol.
- No debe tomar topiramato si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. El topiramato puede hacer que los anticonceptivos sean menos eficaces.
- Las personas con cálculos renales no deben tomar topiramato.
- El topiramato puede interactuar con medicamentos anticonvulsivos como fenitoína, ácido valproico y carbamazepina.
- Tomar medicamentos para un trastorno por consumo de alcohol no es sustituir una droga por otra.

¿Cómo debo tomar topiramato?

- La dosis recomendada de topiramato para el tratamiento del trastorno por consumo de alcohol es de 200 miligramos (mg) divididos dos veces al día.
- Para minimizar los efectos secundarios, se iniciará con una dosis baja que aumentará lentamente.
- Debe tomar muchos líquidos mientras toma topiramato.



¿Cuáles son algunos efectos secundarios del topiramato?

Efectos Secundarios Comunes	¿Qué Puedo hacer si Experimento esto?
Mareos	Levántese despacio para evitar caídas.
Escozor, hormigueo o entumecimiento de la piel	Evite irritantes como agua caliente, zapatos o ropa ajustados.
Cambios en el estado mental: <ul style="list-style-type: none">• Pensamientos o movimientos lentos.• Dificultad para concentrarse o problemas con la memoria.• Dificultades del habla.	Comuníquese con su proveedor si siente que hay señales o síntomas que empeoran notablemente.
Pérdida de peso	<ul style="list-style-type: none">• Trate de mantener una dieta sana y equilibrada.• Mantenga un registro de cualquier cambio significativo en su peso y apetito.

Menos común, pero puede ser severo:


Informe a su proveedor inmediatamente si tiene alguno de los siguientes:

- Cambios de humor, como estado de ánimo deprimido o irritabilidad.
 - pensamientos de hacerse daño a sí mismo o a otros.
- Cambios en la visión.
- Sangre en la orina o dolor al orinar.
- Hable con su proveedor de salud sobre cualquier síntoma que crea que pueda deberse a este medicamento.

Todas las medicinas pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, no todos tienen efectos secundarios. Por lo general, mejoran a medida que su cuerpo se acostumbra a la nueva medicina. Hable con su proveedor o farmacéutico si alguno de los efectos secundarios anteriores le preocupa.

¿Cuánto tiempo debo tomar topiramato?

- Usted y su médico decidirán sobre su plan de tratamiento. La mayoría de las personas toman naltrexona durante 6 meses y, a menudo más.
- No suspenda su medicación sin consultar primero con su proveedor de atención médica.



¡Su proveedor y farmacéutico pueden ayudarle a controlar cualquier efecto secundario para que pueda tener éxito en su recuperación!

Información de contacto:

Línea de crisis para Veteranos
1-800-273-TALK (8255) or Texto - 838255