

Manténgase informado...


Medicamentos para la demencia

Información sobre medicamentos para la demencia:

- Los medicamentos para la demencia pueden mejorar algunos síntomas de la enfermedad, pero es posible que no tengan beneficios duraderos.
- Estos medicamentos pueden causar efectos secundarios durante el uso a largo plazo. Los efectos secundarios pueden incluir pérdida de peso, caídas, empeoramiento de la depresión y la necesidad de comenzar otros medicamentos.
- Dependiendo de qué otras enfermedades tenga, los riesgos y beneficios de continuar o suspender los medicamentos pueden ser diferentes.

Lo que puede hacer:

- Usted, su cuidador (si tiene uno) y su proveedor deberá decidir si el medicamento que está tomando todavía está funcionando o si es el momento de hacer un cambio.
- Si el medicamento ya no le funciona, pregúntele a su proveedor qué es lo que él o ella recomienda.
- **Si su proveedor recomienda suspender un medicamento, no es una señal de “perder la esperanza” o de que “no se puede hacer nada”. Es una manera de encontrar el tratamiento más seguro y más eficaz.**
- Llame a su proveedor si tiene preguntas o inquietudes.



Ejemplos de medicamentos para la demencia:

- Donepecil (Aricept®)
- Galantamina (Razadyne®)
- Rivastigmina (Exelon®)
- Memantina (Namenda®)



Nombre: _____

Fecha: ____ / ____ / ____

Recomendaciones por _____ en _____
(proveedor) (fecha)

Recomendaciones a considerar para las personas que viven con demencia; no todos son recomendados para cada paciente.

- ☐ Haga ejercicio ligero o camine
- ☐ Use sus anteojos y / o audífonos si los tiene
- ☐ Siga un horario de sueño regular
- ☐ Coma una dieta saludable
- ☐ Pare o limite el consumo de alcohol

Cuidador

- ☐ Comuníquese con los servicios de apoyo del cuidador
Datos de contacto: _____
- ☐ Restringir el acceso del paciente a armas de fuego y municiones
- ☐ Alentar al paciente a completar una Directiva Anticipada por escrito

Cambios de medicamentos

- ☐ Puede intentar detener el _____ .
(medicamento)

Reducción gradual sugerida:

(ejemplo: reduzca la dosis por 1/2-1/3 durante 2 semanas y luego pare)

Si su comportamiento o su memoria empeoran o si aparecen nuevos síntomas, llame o regrese a la oficina.

Firmado: _____